

土壤表面処理・発泡施工 防蟻ME剤

(社)日本しろあり対策協会認定剤・(社)日本木材保存協会認定剤

合成ピレスロイド剤

新築
&
既築

安全性

劇物
(希釈液は普通物)



低VOC
低臭性

広口ボトル



残効性



バリア効果



®は登録商標です。

特 徴

1. 殺蟻力&防蟻効果

- ・即効的な殺蟻効果があります。
- ・床下土壌へ有効成分の吸着性が高く、バリア効果が長期間続きます。

2. 優れた安全性

- ・主成分は世界保健機関(WHO)に認められた安全性の高いピフェントリンを使用しています。
- ・揮散しにくいいため、臭気・刺激性が少なく、作業員や居住者に安全です。
- ・水溶解度が低いため、流亡しにくく、安全です。

3. 扱いやすい

- ・土壌表面処理および発泡施工の2つの処理方法があります。
- ・広口ボトルのため希釈作業やボトルの洗浄が容易です。
- ・普通物(劇毒物区分)、非危険物(消防法)のため、輸送・貯蔵の制限がありません。
- ・コンパクトな500g入りのため、倉庫・作業車のスペースを取りません。

組成・性状

組 成	ピフェントリン……5.0%	外 観	青色水溶性液体
比 重	1.063(20℃)	毒劇物区分	劇物(希釈使用液は普通物)
使用濃度	0.05%	魚 毒	C 類相当
希釈倍数	100 倍		

使用方法

散布方法	希釈倍数	標準使用方法・使用量
土壌表面処理	100 倍	帯状散布 5ℓ/m ²
		面状散布 3ℓ/m ²
発 泡 施 工	100 倍	2.5～2.6ℓ/m ² (床高45～50cm) 発泡機「トルトル」により発泡倍率200～300倍で 床下全体を泡で処理。

* 発泡施工には別途、ドルフォーム(起泡剤)が必要です。

ME剤

水に溶けない有効成分を界面活性剤で水に可溶化させた製剤のことであり、水希釈液は2週間安定している。本製品は青色に着色。

⚠ 使用上のご注意

- ・ご使用前に製品ラベルをご熟読いただき、用途以外にはご使用しないで下さい。
- ・ご使用にあたっては、安全チェックリストに従って点検、準備を実施し、安全性が確保された後に作業に入ってください。
- ・魚介類に対する毒性が高いため、河川、湖沼、養魚池などの水系に流入の恐れがある場所での使用には十分ご注意ください。
- ・(社)日本しろあり対策協会の「防除施工標準仕様書並びに安全管理」および日本木材保存剤審査機関の「木材保存処理作業の安全指針」に従って作業を行ってください。

包装 500g×20本入(1ケース)

アリピレス[®]普及会

事務局 エフエムシー・ケミカルズ株式会社

農業製品事業部

〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3

TEL:03-3402-3722 FAX:03-3402-3700